Ejemplo Vamos a probar la desigualdad

$$\frac{2}{\sqrt[4]{e}} \leq \int_0^2 e^{x^2-x} dx \leq 2e^2$$

Solución Tenemos que

$$f(x) = e^{x^2-x} \Rightarrow f'(x) = e^{x^2-x}(2x-1)$$

ahora bien

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow 2x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$$

como f' va de - a + en $x = \frac{1}{2}$, entonces $x = \frac{1}{2}$ es punto mínimo, por lo que $m = e^{\frac{1}{4}-\frac{1}{2}}$ y $M = e^2$

$f(2) = e^2$. Valor máximo alcanzado por la función

$f\left(\frac{1}{2}\right) = e^{\frac{1}{4}-\frac{1}{2}}$. Valor mínimo alcanzado por la función

Por lo tanto

$$e^{-\frac{1}{4}} \leq e^{x^2-x} \leq e^2 \Rightarrow \int_0^2 e^{-\frac{1}{4}} dx \leq \int_0^2 e^{x^2-x} dx \leq \int_0^2 e^2 dx \Rightarrow 2e^{-\frac{1}{4}} \leq \int_0^2 e^{x^2-x} dx \leq 2e^2$$

TEOREMA DEL VALOR MEDIO GENERALIZADO

Teorema 1. Si $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, son funciones continuas en $[a, b]$ y $g(x) > 0$ para todo $x \in [a, b]$, entonces existe $\xi \in [a, b]$, tal que:

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx$$

Demostración. Como $f \in C_{[a, b]}$, entonces existe $m = \min_{[a, b]} f(x)$ y $M = \max_{[a, b]} f(x)$ y se tiene $m \leq f(x) \leq M$ para todo $x \in [a, b]$.

En consecuencia, $mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x)$, por lo que

$$m \int_a^b g(x)dx = \int_a^b f(x)g(x)dx \leq M \int_a^b g(x)dx$$

de donde,

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} \leq M$$

por el Teorema del Valor Intermedio, existe $\xi \in [a, b]$, tal que

$$\frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} = f(\xi)$$

por lo tanto

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx$$

Utilizar lo anterior para mostrar que

$$\frac{1}{7\sqrt{2}} \leq \int_0^1 \frac{x^6}{\sqrt{1+x^2}} dx \leq \frac{1}{7}$$

elegimos $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ y $g(x) = x^6$

Por lo tanto

$$\int_0^1 \frac{x^6}{\sqrt{1+x^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{1+\xi^2}} \int_0^1 x^6 dx = \frac{1}{7\sqrt{1+\xi^2}}$$

como $0 \leq \xi \leq 1$ entonces

$$\frac{1}{7\sqrt{1+1^2}} \leq \frac{1}{7\sqrt{1+\xi^2}} \leq \frac{1}{7\sqrt{1+0^2}}$$

Por lo tanto

$$\frac{1}{7\sqrt{2}} \leq \int_0^1 \frac{x^6}{\sqrt{1+x^2}} dx \leq \frac{1}{7}$$

□

Teorema 2. Sea $f : [a, b] \rightarrow R$ f acotada en $[a, b]$. Si f es continua en $[a, b]$, excepto en un punto entonces f es integrable en $[a, b]$.

Demostración. Supongamos que $x_0 \in [a, b]$ tal que f es discontinua en x_0

Sean $x_\alpha, x_{\alpha+1} \in [a, b]$ tal que $x_0 \in (x_\alpha, x_{\alpha+1})$ y $x_{\alpha+1} - x_\alpha < \frac{\epsilon}{2(M-m)}$. Como f es continua en $[a, x_\alpha]$ y $[x_{\alpha+1}, b]$ f es uniformemente continua por lo tanto f es integrable en $[a, x_\alpha]$ y $[x_{\alpha+1}, b]$

Construimos $P = \{x_0, x_1, \dots, x_\alpha, x_{\alpha+1}, \dots, x_n\}$ y tenemos entonces que

$$\begin{aligned} \bar{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) &= \sum_{i=1}^n (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) = \\ &= \sum_{i=1}^{\alpha} (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) + (M_\alpha - m_\alpha)(x_\alpha - x_{\alpha+1}) + \sum_{i=\alpha+1}^n (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) \end{aligned}$$

Para el primer sumando tenemos que f es continua por lo tanto integrable por lo tanto

$$\sum_{i=1}^{\alpha} (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) < \frac{\epsilon}{4(b-a)} \sum_{i=1}^{\alpha} (x_i - x_{i-1}) = \frac{\epsilon}{4(b-a)}(b-a) = \frac{\epsilon}{4}$$

Para el segundo sumando

$$(M_\alpha - m_\alpha)(x_\alpha - x_{\alpha+1}) \leq (M - m)(x_\alpha - x_{\alpha+1}) < (M - m) \frac{\epsilon}{2(M - m)} = \frac{\epsilon}{2}$$

Para el tercer sumando, usamos el hecho de que f es continua e integrable en $[x_{\alpha+1}, b]$

$$\sum_{i=\alpha+1}^n (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) < \sum_{i=\alpha+1}^n \frac{\epsilon}{4(b-a)}(x_i - x_{i-1}) = \frac{\epsilon}{4(b-a)}(b-a) = \frac{\epsilon}{4}$$

Por lo tanto

$$\overline{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) < \frac{\epsilon}{4} + \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{4} = \epsilon$$

Por lo tanto f es integrable en todo $[a, b]$ □

Teorema 3. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ acotada en $[a, b]$. Si f es continua en $[a, b]$, excepto en x°, x^* entonces f es integrable en $[a, b]$.

Demostración. Supongamos que $x^\circ, x^* \in [a, b]$ tal que f es discontinua en x°, x^*

Sean $x_\alpha, x_{\alpha+1} \in [a, b]$ tal que $x^* \in (x_\alpha, x_{\alpha+1})$ y

$$x_{\alpha+1} - x_\alpha < \frac{\epsilon}{8(M - m)}$$

Sean $x_\beta, x_{\beta+1} \in [a, b]$ tal que $x^\circ \in (x_\beta, x_{\beta+1})$ y

$$x_{\beta+1} - x_\beta < \frac{\epsilon}{8(M - m)}$$

Como f es continua en $[a, x_\alpha], [x_{\alpha+1}, x_\beta]$ y $[x_{\beta+1}, b]$ f es uniformemente continua por lo tanto f es integrable en $[a, x_\alpha], [x_{\alpha+1}, x_\beta], [x_{\beta+1}, b]$

Construimos $P = \{a = x_0, x_1, \dots, x_\alpha, x_{\alpha+1}, x_\beta, x_{\beta+1}, \dots, x_n = b\}$ y tenemos entonces que

$$\begin{aligned} \overline{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) &= \sum_{i=1}^n (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) = \\ &= \sum_{i=1}^{\alpha} (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) + (M_\alpha - m_\alpha)(x_{\alpha+1} - x_\alpha) + (M_\beta - m_\beta)(x_{\beta+1} - x_\beta) + \sum_{i=\beta+1}^n (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) \end{aligned}$$

Para el primer sumando tenemos que f es continua por lo tanto integrable por lo tanto

$$\sum_{i=1}^{\alpha} (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) < \frac{\epsilon}{6(b-a)} \sum_{i=1}^{\alpha} (x_i - x_{i-1}) = \frac{\epsilon}{6(b-a)}(b-a) = \frac{\epsilon}{6}$$

Para el segundo sumando

$$(M_{\alpha} - m_{\alpha})(x_{\alpha+1} - x_{\alpha}) \leq (M - m)(x_{\alpha} - x_{\alpha+1}) < (M - m) \frac{\epsilon}{8(M - m)} = \frac{\epsilon}{8}$$

Para el tercer sumando, usamos el hecho de que f es continua e integrable en $[x_{\alpha+1}, x_{\beta}]$

$$\sum_{i=\alpha+1}^{\beta} (M_i - m_i)(x_i - x_{i+1}) < \sum_{i=\alpha+1}^{\beta} \frac{\epsilon}{6(b-a)}(x_i - x_{i+1}) = \frac{\epsilon}{6(b-a)}(b-a) = \frac{\epsilon}{6}$$

Para el cuarto sumando

$$(M_{\beta} - m_{\beta})(x_{\beta+1} - x_{\beta}) \leq (M - m)(x_{\beta+1} - x_{\beta}) < (M - m) \frac{\epsilon}{8(M - m)} = \frac{\epsilon}{8}$$

Para el quinto sumando, usamos el hecho de que f es continua e integrable en $[x_{\beta+1}, b]$

$$\sum_{i=\beta+1}^b (M_i - m_i)(x_i - x_{i+1}) < \sum_{i=\beta+1}^b \frac{\epsilon}{6(b-a)}(x_i - x_{i+1}) = \frac{\epsilon}{6(b-a)}(b-a) = \frac{\epsilon}{6}$$

Por lo tanto

$$\overline{S}(f, p) - \underline{S}(f, P) = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) < \frac{\epsilon}{6} + \frac{\epsilon}{8} + \frac{\epsilon}{6} + \frac{\epsilon}{8} + \frac{\epsilon}{6} < \epsilon$$

Por lo tanto f es integrable en todo $[a, b]$ □

Teorema.- Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, f acotada en $[a, b]$, si f es continua en $[a, b]$ excepto en un conjunto finito de puntos, entonces f es integrable.

¿Que pasa con una función con una cantidad infinita de discontinuidades?