

Derivadas Parciales de Orden Superior

Si f es una función de doas variables $x, y \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ son funciones de las mismas variables, cuando derivamos $\frac{\partial f}{\partial x}$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$ obtenemos las derivadas parciales de segundo orden, las derivadas de $\frac{\partial f}{\partial x}$ están definidas por:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x+h, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)}{h}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x, y+k) - \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)}{k}$$

Si f es una función de dos variables entonces hay cuatro derivadas parciales de segundo orden.

Consideremos las diferentes notaciones para las derivadas parciales:

$$f_{1,1} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f_{xx}$$

$$f_{1,2} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = f_{xy}$$

$$f_{2,1} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = f_{yx}$$

$$f_{2,2} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = f_{yy}$$

Ejemplo. $z = x^3 + 3x^2y - 2x^2y^2 - y^4 + 3xy$ hallar $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 + 6xy - 4xy^2 + 3y$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 3x^2 - 4x^2y - 4y^3 + 3x$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6x + 6y - 4y^2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -4x^2 - 12y^2$$



$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = 6x - 8xy + 3$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 6x - 8xy + 3$$

Teorema 1. (*Teorema de Schwarz*) Sea $f : A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en el abierto A de \mathbb{R}^2 . Si las derivadas parciales

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \quad y \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

existen y son continuas en A , entonces

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

Demostración. Sea $M = f(x + h_1, y + h_2) - f(x + h_1, y) - f(x, y + h_2) + f(x, y)$ y definimos

$$\varphi(x) = f(x, y + h_2) - f(x, y)$$

de manera que

$$\varphi(x + h_1) - \varphi(x) = f(x + h_1, y + h_2) - f(x + h_1, y) - (f(x, y + h_2) - f(x, y)) = M$$

Aplicando el TVM a φ en el intervalo $[x, x + h_1]$ se tiene que existe $\theta \in (x, x + h_1)$ tal que

$$\varphi(x + h_1) - \varphi(x) = \varphi'(\theta)h_1$$

por otro lado

$$\varphi'(x) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y + h_2) - \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$$

por lo tanto

$$\varphi'(\theta) = \frac{\partial f}{\partial x}(\theta, y + h_2) - \frac{\partial f}{\partial x}(\theta, y)$$

tenemos entonces que

$$M = \varphi(x + h_1) - \varphi(x) = \varphi'(\theta)h_1 = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\theta, y + h_2) - \frac{\partial f}{\partial x}(\theta, y) \right) h_1$$

Consideremos ahora $\psi(y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$. Aplicando el TVM a ψ en el intervalo $[y, y + h_2]$ se tiene que existe $\eta \in (y, y + h_2)$ tal que

$$\psi(y + h_2) - \psi(y) = \psi'(\eta)h_2$$

por otro lado

$$\psi'(y) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y)$$



por lo tanto

$$\psi'(\eta) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, \eta)$$

de esta manera

$$\psi(y + h_2) - \psi(y) = \psi'(\eta)h_2 = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, \eta) \right) h_2$$

y si $\theta \in (x, x + h_1)$ tenemos entonces que

$$\frac{\partial f}{\partial x}(\theta, y + h_2) - \frac{\partial f}{\partial x}(\theta, y) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(\theta, \eta) \right) h_2$$

en consecuencia

$$M = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\theta, y + h_2) - \frac{\partial f}{\partial x}(\theta, y) \right) h_1 = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(\theta, \eta) \right) h_2 h_1$$

Consideremos ahora

$$\bar{\varphi}(y) = f(x + h_1, y) - f(x, y)$$

de manera que

$$\bar{\varphi}(y + h_2) - \bar{\varphi}(y) = f(x + h_1, y + h_2) - f(x + h_1, y) - (f(x, y + h_2) - f(x, y)) = M$$

Aplicando el TVM a $\bar{\varphi}$ en el intervalo $[y, y + h_2]$ se tiene que existe $\bar{\eta} \in (y, y + h_2)$ tal que

$$\bar{\varphi}(y + h_2) - \bar{\varphi}(y) = \bar{\varphi}'(\bar{\eta})h_2$$

por otro lado

$$\bar{\varphi}'(y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x + h_1, y) - \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$$

por lo tanto

$$\bar{\varphi}'(\bar{\eta}) = \frac{\partial f}{\partial y}(x + h_1, \bar{\eta}) - \frac{\partial f}{\partial y}(x, \bar{\eta})$$

tenemos entonces que

$$M = \bar{\varphi}(y + h_2) - \bar{\varphi}(y) = \bar{\varphi}'(\bar{\eta})h_2 = \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x + h_1, \bar{\eta}) - \frac{\partial f}{\partial y}(x, \bar{\eta}) \right) h_2$$

Consideremos ahora $\bar{\psi}(x) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$. Aplicando el TVM a $\bar{\psi}$ en el intervalo $[x, x + h_1]$ se tiene que existe $\bar{\theta} \in (x, x + h_1)$ tal que

$$\bar{\psi}(x + h_1) - \bar{\psi}(x) = \bar{\psi}'(\bar{\theta})h_1$$

por otro lado

$$\bar{\psi}'(x) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) (x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y)$$

por lo tanto

$$\bar{\psi}'(\bar{\theta}) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(\bar{\theta}, y)$$



de esta manera

$$\bar{\psi}(x + h_1) - \bar{\psi}(x) = \bar{\psi}'(\bar{\theta})h_1 = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(\bar{\theta}, y) \right) h_1$$

es decir

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x + h_1, y) - \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(\bar{\theta}, y) \right) h_1$$

y si $\bar{\eta} \in (y, y + h_2)$ tenemos entonces que

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x + h_1, \bar{\eta}) - \frac{\partial f}{\partial y}(x, \bar{\eta}) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(\bar{\theta}, \bar{\eta}) \right) h_1$$

en consecuencia

$$M = \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x + h_1, \bar{\eta}) - \frac{\partial f}{\partial y}(x, \bar{\eta}) \right) h_1 h_2 = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(\bar{\theta}, \bar{\eta}) \right) h_2 h_1$$

igualando ambas expresiones de M se tiene

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(\theta, \eta) \right) h_2 h_1 = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(\bar{\theta}, \bar{\eta}) \right) h_2 h_1$$

donde

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(\theta, \eta) \right) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(\bar{\theta}, \bar{\eta}) \right)$$

Tomando limite cuando $h_1, h_2 \rightarrow 0$ y usando la continuidad asumida de las parciales mixtas se tiene que $\theta, \bar{\theta} \rightarrow x$ y $\eta, \bar{\eta} \rightarrow y$ se concluye

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y)$$

□

Ejemplo Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = x^3 + 3x^2y - 2x^2y^2 - y^4 + 3xy$

En este caso

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 6xy - 4xy^2 + 3y$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 3x^2 - 4x^2y - 4y^3 + 3x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x + 6y - 4y^2$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -4x^2 - 12y^2$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 6x - 8xy + 3$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 6x - 8xy + 3$$



Ejemplo Dada la función

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

tenemos que para $(x, y) \neq (0, 0)$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y \frac{x^4 + 4x^2y^2 - y^4}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x \frac{x^4 - 4x^2y^2 - y^4}{(x^2 + y^2)^2}$$

para el primer caso hacemos $x = 0$ y tenemos

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y \frac{x^4 + 4x^2y^2 - y^4}{(x^2 + y^2)^2} \Big|_{x=0} = -y$$

para el segundo caso hacemos $y = 0$ y tenemos

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x \frac{x^4 - 4x^2y^2 - y^4}{(x^2 + y^2)^2} \Big|_{y=0} = 1$$

Calculamos ahora

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 (-y)}{\partial y \partial x} = -1$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 (1)}{\partial x \partial y} = 1$$

por lo tanto

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = -1 \neq 1 = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

En este caso las parciales segundas no son continuas en $(0, 0)$

Teorema 2. (*Caso General*) Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el abierto A de \mathbb{R}^n tal que

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$$

sean continuas en A , entonces

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$$

