Integral de Superfície sobre funciones escalares

Consideremos el problema del cálculo de la masa total de una lámina, cuya forma es la de una superfície simple S. Supongamos que la lámina es muy delgada y que su densidad no sea constante. Podemos entonces pensar en una función de densidad ρ defnida sobre la superfície de modo que cada $(x, y, z) \in S$ le asocia el núumero real $\rho(x, y, z)$ que da el valor (en unidades de masa por unidad de área) de la densidad de la lámina en el punto (x, y, z). Si dividimos la superfície S en pequeños rectángulos S_{ij} . Si Φ es una función que parametriza a S, cada S_{ij} se puede ver como la imagen de un rectángulo R_{ij} correspondiente a una partición de la región D en pequeños rectángulos



Supongamos que $\rho : S \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ es una función continua que en cada punto de S (superficie) nos asigna su densidad de masa, y que S esta parametrizada por la función $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ entonces, la masa de la lámina en $S_{ij} \approx \rho(x_{ij}, y_{ij}, z_{ik}) \cdot \acute{A}rea \quad R_{ij}$ de modo que la masa total de la lámina es aproximadamente

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} \rho(x_{ij}, y_{ij}, z_{ij}) \cdot \acute{A}rea \quad R_{ij}$$

$\therefore$ La masa total de la lámina será

$$\lim_{n,m\to\infty} \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} \rho(f(u_{ij}, v_{ij})) \left\| \frac{\partial f}{\partial u}(u_{ij}, v_{ij}) \times \frac{\partial f}{\partial u}(u_{ij}, v_{ij}) \right\| = \int\int_D \rho \circ f(u, v) \left\| \frac{\partial f}{\partial u} \times \frac{\partial f}{\partial v} \right\| dudv$$

Definición 1. *Sea $S = f(D)$ una superfície paramétrica descrita por una función $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ de clase C^1 y sean $\rho : V \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ un campo escalar continuo definido en un abierto V de $\mathbb{R}^3$ tal que $S \subset V$. Se define la integral de superfície como*

$$\int_S \rho ds = \int\int_D \rho \circ f(u, v) \left\| \frac{\partial f}{\partial u} \times \frac{\partial f}{\partial v} \right\| dudv$$

Ejemplo Evaluar la integral de superfície $\int\int_S y^2 + 2yz \; ds$ donde S es la porción del plano $2x+y+2z = 6$ que se encuentra en el primer octante



Solución En este caso tenemos que $\rho(x,y,z) = y^2 + 2yz$ mientras que de la ecuación $2x + y + 2z = 6$ despejando a la z $z = \frac{1}{2}(6 - 2x - y)$ podemos obtener una parametrización

$$f(u,v) = (u, v, \frac{1}{2}(6 - 2u - v))$$

donde

$$\frac{\partial f}{\partial u} = (1, 0, -1), \quad \frac{\partial f}{\partial v} = (0, 1, -\frac{1}{2}) \;\Rightarrow\; \frac{\partial f}{\partial u} \times \frac{\partial f}{\partial v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = (1, \frac{1}{2}, 1)$$

por lo tanto

$$\int\int_S y^2 + 2yz ds = \int\int_D \rho(u, v, \frac{1}{2}(6 - 2u - v))\sqrt{1 + 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} dA =$$

$$\int\int_D \left(v^2 + 2v\left(\frac{1}{2}\right)(6 - 2u - v)\right)\sqrt{1 + 1 + \frac{1}{4}} dA = \frac{3}{2}\int\int_D (6v - 2uv)\, dA =$$

$$3\int_0^3 \int_0^{6-2u} v(3-u) dv du = 6\int_0^3 (3-u)^3 du = -\frac{3}{2}(3-u)^4 \,|_0^3 = \frac{243}{2}$$

Vamos a comprobar que el valor de la integral no depende de la parametrización



Sea $g = f \circ \varphi$ por lo tanto tenemos que

$$\int\int_D \rho dA = \int\int_D \rho(f(u,v)) \left\| \frac{\partial f}{\partial u} \times \frac{\partial f}{\partial v} \right\| dudv \underbrace{=}_{(u,v)=\varphi(s,t)} \int\int_{D'} \rho(f(\varphi(s,t))) \left\| N_f(\varphi(s,t)) \right\| \left| \frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s,t)} \right| dsdt$$

$$\int\int_{D'} \rho(f(g(s,t))) \left\| N_g(s,t) \right\| dsdt = \int\int_{D'} \rho dA$$

Ejemplo Sea $\rho : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ dada por $\rho(x,y,z) = ax+by+z$ donde a, b son constantes dadas y consideremos la superfície $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ parametrizada por $f(u,v) = (u, v, u^2+v^2)$ sobre la región $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | u^2+v^2 \leq 1\}$ (La superfície es un paraboloide $z = x^2+y^2$ que se encuentra debajo del plano $z = 1$)



Solución Tenemos que dada la parametrización de la superfície $f(u,v) = (u, v, u^2+v^2)$ entonces

$$T_u = \frac{\partial f}{\partial u} = (1, 0, 2u) \qquad T_v = \frac{\partial f}{\partial v} = (0, 1, 2v) \Rightarrow \|T_u \times T_v\| = \|(-2u, -2v, 1)\|$$

$N_\emptyset = T_u \times T_v = (-2u, -2v, 1)$

$N_\emptyset(1,1) = (-2,-2,1)$



$N_\emptyset(1,1)$ apunta hacia adentro



Orientación Negativa

por otra parte

$$\rho(f(u,v)) = \rho(u, v, u^2 + v^2) = au + by + z$$

$\therefore$

$$\int_s f ds = \int\int_s (au+by+z)\,\|(-2,,-2v,1)\|\,dudv \underbrace{=}_{Polares} \int_0^1\int_0^{2\pi} (ar\cos(\theta)+br\sin(\theta)+r^2)\sqrt{1+4r^2}\cdot r dr d\theta$$

$$= \int_0^1\int_0^{2\pi} ar^2\cos(\theta)\sqrt{1+4r^2}drd\theta + \int_0^1\int_0^{2\pi} br^2\sin(\theta)\sqrt{1+4r^2}drd\theta + \int_0^1\int_0^{2\pi} r^3\sqrt{1+4r^2}drd\theta$$

Vamos a trabajarlas por separado

$$\int_0^1\int_0^{2\pi} ar^2\cos(\theta)\sqrt{1+4r^2}drd = \int_0^1 r^2\sqrt{1+4r^2}dr\int_0^{2\pi} a\cos(\theta)d\theta = \int_0^1 r^2\sqrt{1+4r^2}dr\left(a\sin(\theta)\,\Big|_0^{2\pi}\right) =$$

$$\int_0^1 r^2\sqrt{1+4r^2}dr\cdot(0) = 0$$

Para la segunda

$$\int_0^1\int_0^{2\pi} br^2\sin(\theta)\sqrt{1+4r^2}drd\theta = \int_0^1 r^2\sqrt{1+4r^2}dr\int_0^{2\pi} b\sin(\theta)d\theta = \int_0^1 r^2\sqrt{1+4r^2}dr\left(-b\cos(\theta)\,\Big|_0^{2\pi}\right) =$$

$$\int_0^1 r^2\sqrt{1+4r^2}dr\,(0) = 0$$

Finalmente

$$\int_0^1\int_0^{2\pi} r^3\sqrt{1+4r^2}drd\theta = \int_0^1 r^3\sqrt{1+4r^2}dr\int_0^{2\pi} d\theta = \int_0^1 r^3\sqrt{1+4r^2}dr(2\pi) =$$

$$\frac{1}{8}\int_0^1 r^2 8r\sqrt{1+4r^2}dr(2\pi) \underbrace{=}_{\substack{u=r^2 \quad du=2rdr \\ dv=8r\sqrt{1+4^2} \quad v=\frac{2}{3}(1+4r^2)^{\frac{3}{2}}}} \frac{1}{8}\left(r^2\left(\frac{2}{3}\right)(1+4r^2)^{\frac{3}{2}} - \left(\frac{2}{3}\right)\int_0^1 (1+4r^2)^{\frac{3}{2}} 2rdr\right)(2\pi)$$

$$= \left(\frac{\pi}{12}\right)\left(5^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{5}\right)$$

Ahora vamos a dar una reparametrización de la región $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | x^2+y^2 \leq 1\}$, para ello consideremos la región $D' = \{(s,t) \in \mathbb{R}^2 | s^2+t^2 \leq \frac{1}{2}\}$ y vamos a proceder de la siguiente forma:

$$s^2+t^2 \leq \frac{1}{2} \Rightarrow 2s^2+2t^2 \leq 1 \Rightarrow s^2+2st+t^2+s^2-2st+t^2 \leq 1 \Rightarrow (s+t)^2+(s-t)^2 \leq 1$$

por lo tanto proponemos $g(s,t) = (s+t, s-t) = (u,v)$ y la reparametrización $\phi : D' \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ quedaria

$$\phi(s,t) = f \circ g(s,t) = f(g(s,t)) = f(s+t, s-t) = (s+t, s-t, (s+t)^2+(s-t)^2) = (s+t, s-t, 2s^2+2t^2)$$

donde

$$\frac{\partial\phi}{\partial s} = (1,1,4s) \quad \frac{\partial\phi}{\partial t} = (1,-1,4t) \quad \Rightarrow \quad \left\|\frac{\partial\phi}{\partial s} \times \frac{\partial\phi}{\partial t}\right\| = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 1 & 4s \\ 1 & -1 & 4t \end{vmatrix} = (4s+4t, 4s-4t, -2)$$

$N_{\emptyset(g)} = T_{\emptyset(g)s} \times T_{\emptyset(g)t} = (4s+4t, 4s-4t, -2)$

$N_{\emptyset(g)}(1,1) = (8,0,-2)$



$N_{\emptyset(g)}(1,1)$ apunta hacia afuera



Orientación Positiva

Por lo tanto para calcular la integral de superfície $\rho(x,y,z) = ax+by+z$ se tiene que

$$\int\int_{D'} \rho dA = \int\int_{D'} \rho(\phi(s,t)) \left\|\frac{\partial\phi}{\partial s} \times \frac{\partial\phi}{\partial t}\right\| dsdt =$$

$$\int\int_{D'} \left(a(s+t) + b(s-t) + 2s^2 + 2t^2\right)\sqrt{4+32(s^2+t^2)}dsdt$$

$$\underbrace{=}_{Polares} \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \left((a+b)r\cos(\theta) + (a-b)r\sin(\theta) + 2r^2\right) \sqrt{4+32r^2}\, r dr d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} 2r^3\sqrt{4+32r^2} dr d\theta = (2\pi) \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} 4r^3\sqrt{1+8r^2} dr = (2\pi)\left(\frac{5^{\frac{3}{2}}}{24} + \frac{1}{120}\right) = \left(\frac{\pi}{12}\right)\left(5^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{5}\right)$$

por lo tanto la integral de superficie no depende de la parametrización de la superficie