

TEORIA DE LA COMPARACION

Definición₁. a es *Equipotente* a b syss hay una biyección de a a b .

$$1) a \sim_f b \text{ syss } f: a \rightarrow b$$

$$2) a \sim b \text{ syss } \exists f(a \sim_f b)$$

Cuando se tiene que $a \sim b$ se suele decir que a y b *tienen el mismo Cardinal* y esto incluso se describe con la ecuación $|a| = |b|$. Esto puede ser confudente. Hay que aclarar las cosas; en primer lugar, esta definición establece una **relación** (de hecho, una relacional) entre conjuntos y **NO** se está definiendo lo que es o *sería* el **Cardinal** de un conjunto. Lo único que se tiene es una manera de comparar dos conjuntos *del mismo tamaño*.

Proposición₁.

1) \sim es una relacional de equivalencia sobre V .

2) Sea $[a]_{\sim} = \{b \mid b \sim a\}$. Así

a) $[\emptyset]_{\sim} = 1$, y

b) Si $a \neq \emptyset$ entonces $[a]_{\sim} \notin V$.

Prueba: La parte 1) y la 2.a) son inmediatas, se queda de **Tarea 2.b)**. †

Definición₂.

1) *Dominancia*.

a) $a \lesssim_f b \text{ syss } f: a \rightarrow b$

b) $a \lesssim b \text{ syss } \exists f[a \lesssim_f b]$

2) *Dominancia Estricta*.

$a < b \text{ syss } a \lesssim b \ \& \ a \not\sim b$

Observación. Si $\exists f[f: a \rightarrow b]$ y $\neg \exists g[g: a \rightarrow b]$, entonces $a < b$.

¿Qué puede decir de la conversa?

Proposición₂.

1) \lesssim es reflexiva y transitiva pero **no**-antisimétrica sobre V .

\lesssim es un pre-orden sobre V .

2) $<$ es irreflexiva y **no**-tricotómica sobre V .

¿Qué puede se puede decir de la asimetría y de la transitividad de $<$? y de ¿la dicotomía de \lesssim ? Algo que viene a ayudar, en forma parcial, es el siguiente resultado.

Proposición₃. (Teorema de Cantor–Schöeder–Bernstein.)

$$\forall x, y [x \lesssim y \ \& \ y \lesssim x \rightarrow x \sim y]$$

Prueba. Sean a, b, f, g , tales que $a \lesssim_f b$ y $b \lesssim_g a$. Contruiremos $h : a \twoheadrightarrow b$.

Definimos $\{C_n / n \in \omega\}$ recursivamente, como sigue:

- I). $C_0 = a \setminus g[b]$
- II). $\forall n \in \omega, C_{n+1} = g[f[C_n]]$

Sea $C = \bigcup_{n \in \omega} C_n$. También nos ayudará la siguiente,

Notación: Para $n \in \omega$ escribiremos $D_n = f[C_n]$ y también ponemos, $D = \bigcup_{n \in \omega} D_n$.

Observaciones:

- 1) $C \subseteq a$ y $D \subseteq b$
- 2) $a \setminus C \subseteq g[b]$
- 3) $g^{-1} : g[b] \twoheadrightarrow b$, $g^{-1} \circ g = Id_b$ y $g \circ g^{-1} = Id_{g[b]}$
- 4) $\forall n \in \omega, C_{n+1} = g[D_n]$

Con ayuda de **1)**, **2)**, y **3)** podemos definir una función $h : a \rightarrow b$ como sigue:

$$\forall x \in a, h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{Si } x \in C \\ g^{-1}(x) & \text{Si } x \notin C \end{cases}$$

Veamos que $a \sim_h b$.

h es inyectiva] Sean $x, y \in a$ con $x \neq y$. Veamos que $h(x) \neq h(y)$.

Si ambos $x, y \in C$ o bien ambos $x, y \notin C$, entonces por la inyectividad de f o la de g^{-1} , respectivamente, tenemos lo que queríamos. Supongamos s.p.g. que $x \in C$ y que $y \notin C$.

Por un lado, tenemos que hay un $n_0 \in \omega$ tal que $x \in C_{n_0}$ y también que $h(x) = f(x)$; por lo que $h(x) = f(x) \in f[C_{n_0}] = D_{n_0}$.

Por otro lado, $h(y) = g^{-1}(y)$. Afirmamos que $g^{-1}(y) \notin D_{n_0}$, pues si $g^{-1}(y) \in D_{n_0}$, tendríamos que

$$y = \underset{3)}{g} \left(\underset{4)}{g^{-1}(y)} \right) \in \underset{4)}{g[D_{n_0}]} = C_{n_0+1} \subseteq C \quad \nabla \quad \bigcirc !!$$

Concretando, tenemos que $h(x) \in D_{n_0}$ y $h(y) \notin D_{n_0}$ por lo que $h(x) \neq h(y)$.

h es suprayectiva] Sea $z \in b$. Tenemos dos opciones:

Si $z \in D$, hay un $n_0 \in \omega$ tal que $z \in D_{n_0} = f[C_{n_0}]$, por lo que hay un $x \in C_{n_0} \subseteq C$ tal que $f(x) = z$ y de la definición de h , $h(x) = f(x) = z$. Y x es el buscado.

Supongamos ahora que $z \notin D$. Si $g(z) \notin C$ ya habríamos terminado, pues de la definición de h ,

$$h(g(z)) = g^{-1}(g(z)) = z$$

3)

Y $g(z)$ sería el que buscamos. Veamos pues, que $\forall n \in \omega, g(z) \notin C_n$.

Sea $n \in \omega$, tenemos dos casos;

Si $n = 0$. Tenemos que $g(z) \notin C_0$, pues $C_0 = a \setminus g[b]$ y $g(z) \in g[b]$.

Si $n = m + 1$, para algún $m \in \omega$. No puede ser que $g(z) \in C_{m+1}$, pues si lo fuera, $g(z) \in C_{m+1} = g[D_m]$ y habría por tanto, un $w \in D_m$ tal que $g(z) = g(w)$ y por la inyectividad de g , $z = w$ con lo que $z \in D_m \subseteq D \quad \nabla !!!$

†

Corolario₄. (Teorema del Sandwich)

$$\forall x, y, z [x \lesssim y \ \& \ y \lesssim z \ \& \ x \sim z \rightarrow x \sim y \sim z]$$

Corolario₅.

- 1) $<$ es asimétrica sobre V
- 2) $<$ es transitiva sobre V
- 3) La dominancia estricta, $<$, establece un Orden Parcial sobre V

Ejemplos: ...

Proposición₆. (Cantor 189?)

$$\forall a [a < \wp(a)].$$

Prueba. 1). $a \lesssim_f \wp(a)$ donde $f(x) = \{x\}$ para $x \in a$.

2). Sea $g : a \rightarrow \wp(a)$. Tenemos que g no es suprayectiva; ya que

$$b = \{x \in a / x \notin f(x)\} \notin IM(G)$$

pues en caso contrario habría un $x_0 \in a$ tal que $f(x_0) = b$, lo cual nos lleva a la siguiente contradicción,

$x_0 \in b$	syss	$x_0 \notin f(x_0)$	def de	b
	syss	$x_0 \notin b$	$f(x_0) =$	b

Por tanto $a \rightsquigarrow \wp(a)$.

†

Proposición₇. $\wp(a) \sim {}^a 2$.

Prueba: Para cada conjunto $b \subseteq a$ definimos $C_b : a \rightarrow 2$ como sigue:

$$\forall x \in a, C_b(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in b \\ 0 & \text{si } x \notin b \end{cases}$$

A C_b se le conoce con el nombre de *La Función Característica de b* .

Así, si para cada $b \subseteq a$ ponemos $f(b) = C_b$ tenemos que $f : \wp(a) \rightarrow {}^a 2$. Pues:

f es inyectiva] Sean $b, c \subseteq a$ con $b \neq c$. Spg. sea $x \in b \setminus c$, así $C_b(x) = 1$ mientras que $C_c(x) = 0$ y por tanto $C_b \neq C_c$ y de aquí que $f(b) \neq f(c)$.

f es suprayectiva] Sea $g : a \rightarrow 2$. Veamos que $g \in \text{IMG}(f)$.

Sea $b = \{x \in a \mid g(x) = 1\} = g^{-1}[\{1\}]$. Tenemos que $C_b = g$ y por tanto $f(b) = g$. †